

# Guide d'identification des espèces capturées dans les pêcheries tropicales


*Version 2.1 – Août 2022*

Philippe S. Sabarros, Flore Moussy, Esther Mollier  
IRD – Ob7


## Les principales familles




Scombridae (MAX)




Istiophoridae (BIL)




Carcharhinidae (RSK)



Balistidae (TRI)




Xiphiidae (SWO)




Lamnidae (MSK)




Monacanthidae (FFX)




Carangidae (CGX)




Alopiidae (THR)



Coryphaenidae (DOX)



Sphyraenidae (BAZ)




Mobulidae (RMV)

## Les espèces présentes dans ce guide

Code FAO	Nom commun	Page	Code FAO	Nom commun	Page	Code FAO	Nom commun	Page	Code FAO	Nom commun	Page
	Poissons osseux		NGT	Carangue des îles	32	REZ	Rémora des marlins	61	SPL	Requin-marteau halicorne	88
BET	Thon obèse	4	NXU	Carangue noire	33	REY	Rémora des espadons	62	SPK	Grand requin-marteau	89
YFT	Thon albacore	5	NXI	Carangue tête	34	RRL	Rémora des mantas	63	BTH	Renard à gros yeux	90
ALB	Germon	6	UDD	Carangue langue blanche	35		Poissons à rostre		PTH	Renard pélagique	91
SKJ	Listao	7	URU	Carangue paia	36	BLM	Marlin noir	64	ALV	Renard	92
BLT	Bonitou	8	USE	Carangue coton	37	BUM	Marlin bleu	65	RHN	Requin baleine	93
FRI	Auxide	9	YTL	Sérieole limon	38	MLS	Marlin rayé	66		Raies	
KAW	Thonine orientale	10	YTC	Sérieole chicard	39	WHM	Marlin blanc de l'Atlantique	67	RRY	Raie guitare à nez rond	94
LTA	Thonine commune	11	KYP	Calicagère nca	40	SFA	Voilier Indo-pacifique	68	RMM	Diable de mer	95
RRU	Comète saumon	12	KYS	Calicagère blanche	41	SAI	Voilier de l'Atlantique	69	RMJ	Mante aiguillat	96
ALM	Bourse loulou	13	KYV	Saupe grise à lignes jaunes	42	SPF	Makaire bécune	70	RMO	Mante vampire	97
ALN	Bourse écriture	14	KYC	Calicagère bleue	43	SSP	Makaire à rostre court	71	RMT	Diable de mer chilien	98
CNT	Baliste rude	15	HDV	Rouffe impérial	44	SWO	Espadon	72	RMB	Mante géante	99
NHR	Baliste pélagique à grandes écailles	16	IQV	Castagnole tropicale	45		Requins		PLS	Pastenague violette	100
CZT	Baliste océanique	17	POA	Grande castagnole	46	FAL	Requin soyeux	73		Tortues	
TRG	Baliste cabri	18	LGH	Compère océanique	47	OCS	Longimane	74	LKV	Tortue olivâtre	101
JKY	Bourse cabri	19	3DEY	Porc-épic pélagique	48	BSH	Requin peau bleue	75	TTL	Tortue caouanne	102
DOL	Dorade coryphène	20	DHO	Proc-épic ballon	49	SMA	Taupe bleue	76	TUG	Tortue verte	103
CFW	Coryphène dauphin	21	DIY	Porc-épic boubou	50	LMA	Petite taupe	77	TTH	Tortue caret	104
LOB	Croupia roche	22	BAF	Orphie plate	51	CCL	Requin bordé	78	DKK	Tortue luth	105
WAH	Thazard-bâtard	23	BTS	Aiguille crocodile	52	CCB	Requin tisserand	79		Cétacés	
GBA	Barracuda	24	GES	Escolier serpent	53	CCA	Requin babosse	80	SHW	Globicéphale tropical	106
NAU	Poisson pilote	25	ALX	Lancier longnez	54	CCP	Requin gris à haute dorsale	81	FAW	Faux-orque	107
DDD	Poisson-bagnard	26	MOX	Poisson lune	55	BRO	Requin cuivre	82	HUW	Baleine à bosse	108
BAO	Platax à longues nageoires	27	MOP	Poisson lune à bosse	56	ALS	Requin pointe blanche	83	SPW	Cachalot	109
LXR	Poule d'eau	28	MRW	Poisson lune lancéolé	57	CCE	Requin bouledogue	84	BLW	Rorqual bleu	110
MSD	Comète maquereau	29	RZV	Ranzania	58	CCF	Requin balestrine	85	FIW	Rorqual commun	111
RUB	Carangue coubali	30	EHN	Rémora commun	59	TIG	Requin tigre commun	86	DRR	Dauphin de Risso	112
CXS	Carangue vorace	31	REO	Rémora des requins	60	SPZ	Requin-marteau commun	87			

**Thon obèse ▶ Bigeye tuna ▶ Patudo**

*Thunnus obesus*



Espèce commune		
Taille max.	180 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Juvéniles : lignes ou marques blanches verticales irrégulières, largement espacées



## Thon à nageoires jaunes, thon albacore ▶ Yellowfin tuna ▶ Rabil

*Thunnus albacares*

Dos noir séparé de la bande dorée par une étroite bande bleue

Très longues nageoires dorsale et anale sur les grands individus

Pinnules jaunes à bord noir fin

©IOTC

Flancs et ventre argentés

Encoche en forme de V

Nageoire pectorale légèrement arrondie s'étendant jusqu'à la base de la seconde dorsale

Rayures régulières bien visibles jusqu'à l'avant, faiblement espacées alternées avec des lignes en pointillé

Espèce commune

Taille max.	239 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



©IRD




©IRD



©ORTHONGEL

## Germon ▶ Albacore ▶ Atún blanco

*Thunnus alalunga*

Hauteur de corps maximum au milieu du corps

Très longue nageoire pectorale  
dépassant la seconde dorsale  
et la nageoire anale

Marge blanche sur le bord de la nageoire caudale

Espèce commune		
Taille max.	140 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	




©ORTHONGEL



©ORTHONGEL

## Bonite à ventre rayé, thon listao ▶ Skipjack tuna ▶ Listado

*Katsuwonus pelamis*


4 à 6 lignes longitudinales sur le ventre

Espèce commune		
Taille max.	110 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	




**Bonitou ▶ Bullet tuna ▶ Melvera**

*Auxis rochei*




Espèce commune		
Taille max.	50 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Corps nu à l'exception du corselet qui est bien développé dans sa partie postérieure (plus de 6 écailles de large sous l'origine de la seconde dorsale, généralement 10 à 15)




Auxide ▶ Frigate tuna ▶ Melva


*Auxis thazard*



Espèce commune		
Taille max.	65 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Corselet étroit dans sa partie postérieure (pas plus de 5 écailles de large sous origine de la seconde nageoire dorsale)




Thonine orientale ▶ Kawakawa ▶ *Bacoreta orientalis**Euthynnus affinis*

Espèce commune		
Taille max.	100 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
<del>Atlantique</del>		Indien

Généralement plusieurs tâches sombres caractéristiques entre les nageoires pelviennes et pectorales




## Thonine commune ▶ Little tunny ▶ Bacoreta

*Euthynnus alletteratus*

Espèce commune		
Taille max.	122 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	




## Comète saumon ► Rainbow runner ► Macarela salmón

*Elagatis bipinnulata*

Espèce commune		
Taille max.	180 cm	FL
Taille obs.	39-90 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Bourse loulou ▶ Unicorn leatherjacket filefish ▶ Puerco unicorno

*Aluterus monoceros*

## Espèce commune

Taille max.	76 cm	TL
Taille obs.	26-51 cm	TL

présente dans

Atlantique

Indien



## Bourse écriture ▶ Scribbled leatherjacket filefish ▶ Puerco de altura

*Aluterus scriptus*

Coloration du corps variable selon le milieu

Lignes longitudinales et points sur les côtés

Museau pointu


Nageoire caudale aussi longue que le museau

Espèce commune

Taille max.	110 cm	TL
Taille obs.	22-53 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Baliste rude ▶ Rough triggerfish ▶ Calafate áspero

*Canthidermis maculata*

Corps de couleur violette à noire avec des taches blanches pouvant disparaître chez les grands individus

Espèce commune		
Taille max.	50 cm	TL
Taille obs.	24-42 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



Baliste pélagique à grandes écailles ▶ Largescale triggerfish ▶ *Ballesta escamoso**Canthidermis macrolepis*


Espèce assez rare		
Taille max.	60 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
<del>Atlantique</del>		Indien



## Baliste océanique ▶ Ocean triggerfish ▶ Sobaco lija

*Canthidermis sufflamen*

Rainure distincte  
devant l'œil



Absence de tympan au dessus  
des pectorales

Couleur gris brunâtre

Nageoire caudale des  
adultes avec deux lobes ;  
caudale arrondie chez les  
juvéniles. Pas de  
prolongation des  
extrémités comme pour  
*Balistes capricus*

Nageoires dorsale et anale très élevées ;  
les premiers rayons sont presque aussi  
longs que la tête

Espèce assez rare

Taille max.	65 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL

présente dans

Atlantique

~~Indien~~



©ORTHONGEL




©ORTHONGEL



©FishBase

## Baliste cabri ▶ Grey triggerfish ▶ Pejepuerco blanco


*Balistes capriscus*

Rayons de la nageoire caudale légèrement prolongés au-dessus et au-dessous

Espèce commune		
Taille max.	60 cm	TL
Taille obs.	19-36 cm	TL
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	

Tympan flexible formé par des écailles au-dessus de la base de la nageoire pectorale, juste derrière la fente branchiale, très élargies et partiellement séparées



Bourse cabri ► American whitespotted filefish ► *Lija colinegra**Cantherhines macrocerus*



## Espèce assez rare

Taille max.	46 cm	TL
Taille obs.	18-29 cm	TL
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	



# Dorade coryphène ▶ Common dolphinfish ▶ Llampuga

*Coryphaena hippurus*



Une seule nageoire dorsale très longue et haute qui s'étend du dessus de l'œil jusqu'à la nageoire caudale

Corps très comprimé latéralement

Une seule nageoire anale concave s'étendant de l'anus jusqu'à la nageoire caudale

Nageoire caudale profondément fourchue

Espèce commune

Taille max.	178 cm	FL
Taille obs.	47-116 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	




**Coryphène dauphin ▶ Pompano dolphinfish ▶ Llampuga borda**

*Coryphaena equiselis*

NB: Ne pas confondre avec une *C. hippurus* femelle

Profil de tête légèrement convexe

Nageoire dorsale longue et haute s'étendant jusqu'à la nageoire caudale



Corps très comprimé latéralement


Nageoire anale convexe

Nageoire caudale profondément fourchue

Espèce commune		
Taille max.	146 cm	FL
Taille obs.	30-71 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Croupia roche, Vieille des bois ▶ Tripletail ▶ Dormilona

*Lobotes surinamensis*

©IGFA

Différentes nuances de brun jaune à brun foncé avec des tâches définies et des marbrures. Les jeunes sont souvent jaunâtres brillants, devenant plus foncés avec l'âge

Espèce commune		
Taille max.	110 cm	TL
Taille obs.	30-58 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



©TAAF



©IRD




©IRD

## Thazard-bâtard ▶ Wahoo ▶ Peto

*Acanthocybium solandri*

Grande bouche avec des dents finement dentelées

Ligne latérale se courbant sous la première nageoire dorsale



Corps très allongé, fusiforme et légèrement comprimé latéralement

Dos vert bleuâtre irisé; flancs argentés avec des barres verticales bleu cobalt qui s'étendent jusqu'en dessous de la ligne latérale

Espèce commune


Taille max.	246 cm	FL
Taille obs.	69-125 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



Barracuda ▶ Great barracuda ▶ *Picuda barracuda**Sphyraena barracuda*

Origine de la première nageoire dorsale (épineuse) légèrement derrière l'origine de la nageoire pelvienne

Deuxième nageoire dorsale, anale et caudale violettes à noires avec des extrémités blanchâtres



©FAO

Espèce commune		
Taille max.	200 cm	TL
Taille obs.	66-129 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Tête large, avec un long museau pointu

Corps allongé et légèrement comprimé

Barres et taches sombres



©ORTHONGEL




©IRD




©IRD

## Poisson pilote ▶ Pilotfish ▶ Pez piloto

*Naucrates ductor*

Espèce commune		
Taille max.	65 cm	FL
Taille obs.	17-37 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



**Poisson-bagnard ▶ Indo-Pacific sergeant ▶ Sargento Indo-Pacífico**
*Abudefduf vaigiensis*

Espèce rare

Taille max.	17 cm	TL
Taille obs.	6-11cm	TL

présente dans

Atlantique

Indien




**Platax à longues nageoires ▶ Longfin batfish ▶ Pez murciélago de aleta grande**

*Platax teira*

Bosse osseuse sur la tête, profil de la tête presque vertical

Corps rond et fortement comprimé latéralement

29 à 34 rayons mous



©FAO

Espèce commune		
Taille max.	70 cm	TL
Taille obs.	13-47 cm	TL
présente dans		
Atlantique		Indien

Bande noire traversant l'œil, seconde bande de l'origine de la nageoire dorsale au ventre, et 3<sup>e</sup> petite bande au-dessus de l'anale

Tâche noire caractéristique sous la pectorale

Corps de couleur argentée, jaunâtre

21 à 26 rayons mous



©TAAF



©IRD



©ORTHONGEL

# Poule d'eau ▶ Orbicular batfish ▶ Dalapugán

*Platax orbicularis*


Corps triangulaire et fortement comprimé latéralement

Front concave avec un renflement osseux entre les yeux

Bande sombre traversant l'œil

Seconde bande sombre allant de la nageoire dorsale à la nageoire ventrale

Nageoires pouvant être jaunes



36 à 37 rayons mous

Couleur gris jaunâtre argenté avec des barres verticales noirâtres s'estompant avec l'âge.

©FAO

25 à 27 rayons mous

Espèce commune

Taille max.	60 cm	TL
Taille obs.	14-36 cm	TL
présente dans		
<del>Atlantique</del>	Indien	



©IRD




©IRD



©IRD

## Comète maquereau ▶ Mackerel scad ▶ Macarela indica

*Decapterus macarellus*

Espèce commune		
Taille max.	70 cm	FL
Taille obs.	24-43 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



©ORTHONGEL



©IRD




©IRD



©IRD


## Carangue coubali ▶ Blue runner ▶ Cojinúa negra

*Caranx crysos*

Espèce commune		
Taille max.	60 cm	FL
Taille obs.	25-40 cm	FL
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	




## Carangue vorace ▶ Bigeye trevally ▶ Jurel voráz

*Caranx sexfasciatus*

Espèce commune		
Taille max.	110 cm	FL
Taille obs.	24-62 cm	FL
présente dans		
Atlantique		Indien



## Carangue des îles ▶ Island trevally ▶ Jurel isleño

*Carangoides orthogrammus*

Espèce commune		
Taille max.	67 cm	FL
Taille obs.	21-33 cm	FL
présente dans		
Atlantique		Indien



**Carangue noire ▶ Black jack ▶ Jurel común***Caranx lugubris*

Nageoire dorsale avec 8 épines suivies  
d'une épine et de 20 à 23 rayons mous

Profil de tête  
relativement raide  
et anguleux

Grand œil


Nageoires pectorales falciformes  
plus longues que la tête

Corps et tête gris à brun foncé ou noir avec nageoires noires

Pointes des nageoires dorsale  
et anale allongées

Ligne latérale avec un arc antérieur  
fort moyennement long

Nageoire anale à 2 épines suivies d'une  
épine et de 17 à 20 rayons mous



Espèce assez rare		
Taille max.	93 cm	FL
Taille obs.	31-37 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	




©ORTHONGEL



©ORTHONGEL

## Carangue tête ▶ Giant trevally ▶ Jurel gigante

*Caranx ignobilis*

Espèce assez rare		
Taille max.	155 cm	FL
Taille obs.	61-78 cm	FL
présente dans		
<del>Atlantique</del>	Indien	



# Carangue langue blanche ▶ Whitetongue jack ▶ Jurel lengua blanca


*Uraspis helvola*




Langue, palais et plancher de la bouche blanc ou crème, le reste bleu/noir

8 épines courtes et minces

Une épine suivie de 27 à 32 rayons mous



Une épine suivie de 19 à 23 rayons mous



2 zones nues dépourvues d'écaillles

Espèce commune

Taille max.	53 cm	FL
Taille obs.	21-32 cm	FL

présente dans

Atlantique

Indien



**Carangue paia ▶ Whitemouth jack ▶ Jurel paia**

*Uraspis uraspis*




Langue, palais et plancher de la bouche blanc ou crème, le reste bleu/noir

8 courtes épines minces

Une épine suivie de 25 à 30 rayons mous

Le corps et la tête sont sombres, noir sur le dos, gris sombre ou pâle sur le ventre




©FAO

Une épine suivie de 17 à 22 rayons mous

Large zone dépourvue d'écaillés en-dessous de l'opercule jusqu'à l'origine des nageoires pelviennes

Espèce commune		
Taille max.	28 cm	FL
Taille obs.	25-28 cm	FL
présente dans		
Atlantique		Indien



©IRD



©IRD



©IRD



©IRD

## Carangue coton ▶ Cottonmouth jack ▶ Jurel volantín

*Uraspis secunda*

8 épines courtes et minces

Une épine suivie de 27 à 32 rayons mous

Seulement  
palais blanc et  
reste de la  
bouche noir

©FAO

Espèce commune		
Taille max.	45 cm	FL
Taille obs.	23-39 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Une épine suivie de 19 à 23 rayons mous

Nageoires pelviennes très longues chez les juvéniles  
mais devenant relativement plus courtes avec l'âge2 zones nues  
dépourvues d'écaillés

U. secunda

U. uraspis

naked areas

naked areas




©IRD



©ORTHONGEL

# Sérieole limon ▶ Longfin yellowtail ▶ Madregal limón


*Seriola rivoliana*



Espèce commune		
Taille max.	160 cm	FL
Taille obs.	26-125 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Sérieole chicard ▶ Yellowtail amberjack ▶ Madregal rabo amarillo

*Seriola lalandi*


Espèce rare		
Taille max.	232 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Calicagère nca ▶ Sea chub nei ▶ Chopa nep

*Kyphosus spp*

NB: Code KYP à utiliser lorsqu'il est impossible de discriminer KYV et KYS



Corps de couleur grise ou bleue ou brun argenté, avec des lignes longitudinales distinctes sur les côtés

Nageoire anale avec 3 épines démarrant légèrement derrière le milieu du corps

Espèce commune		
Taille max.	80 cm	TL
Taille obs.	20-50 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Calicagère blanche ▶ Bermuda sea chub ▶ Chopa blanca


*Kyphosus sectatrix*

Une seule nageoire dorsale continue avec 11 épines et 11 à 13 (généralement 11) rayons mous

Tête courte et petite bouche

Nageoires pectorales courtes


Corps de couleur grise avec de pâles lignes jaunes sur le côté et une ligne jaune partant du coin de la bouche



Espèce commune		
Taille max.	76 cm	TL
Taille obs.	23-44 cm	TL
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	



## Saube grise à lignes jaunes ▶ Brassy chub ▶ Chopa rayada

*Kyphosus vaigiensis*

Espèce commune		
Taille max.	70 cm	TL
Taille obs.	20-36 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




**Calicagère bleue ▶ Blue sea chub ▶ Chopa azul**

*Kyphosus cinerascens*

11 épines dorsales

Grande nageoire à 12 rayons mous s'étendant vers l'arrière



Bosse au-dessus des narines



©FAO

Espèce commune		
Taille max.	55 cm	TL
Taille obs.	18-37 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Grande nageoire anale s'étendant vers l'arrière



©IRD




©TAAF



©IRD

# Rouffe impérial ▶ Imperial blackfish ▶ Rufo imperial


*Schedophilus ovalis*



Espèce rare		
Taille max.	100 cm	TL
Taille obs.	39-47 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Castagnole tropicale ▶ Bigtooth pomfret ▶ [NA]

*Brama orcini*

Espèce rare		
Taille max.	42 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
<del>Atlantique</del>	Indien	



## Grande castagnole ▶ Atlantic pomfret ▶ Japuta

*Brama brama*


Espèce rare		
Taille max.	78 cm	FL
Taille obs.	16-28 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Compère océanique ▶ Oceanic puffer ▶ Tamboril liebre

*Lagocephalus lagocephalus*

Face dorsale d'un gris uniforme ou gris  
verdâtre, flancs argentés, ventre blanc



Tête émoussée avec  
des mâchoires formant  
un bec à 2 dents

Peau rugueuse et poche  
ventrale pouvant se gonfler

Espèce commune

Taille max.	61 cm	TL
Taille obs.	26-47 cm	TL


présente dans

Atlantique

Indien



# Porc-épic pélagique ▶ Pelagic porcupinefish ▶ Pez erizo pelágico

*Diodon eydouxi*

Espèce commune		
Taille max.	27 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique		Indien




# Porc-épic ballon ▶ Longspined porcupinefish ▶ Pejerizo balón

*Diodon holocanthus*

Épines frontales très longues

Corps clair avec de grosses taches sombres sur le dos et de petites taches noires sur les flancs

Pas d'épines sur le pédoncule caudal



Pas de taches sur les nageoires

Nageoires dorsales et anales arrondies et en retrait sur le corps

Espèce assez rare


Taille max.	50 cm	TL
-------------	-------	----

Taille obs.	NA-NA cm	TL
-------------	----------	----

présente dans

Atlantique

Indien




Porc-épic boubou ▶ Spotted porcupinefish ▶ Pejerizo común

*Diodon hystrix*

Épines frontales plus longues que le diamètre des yeux

Corps trapu, brun clair avec de nombreux points noirs

Épines sur la partie dorsale du pédoncule caudal



©FAO

Points noirs sur les nageoires pectorales, dorsale, anale et caudale


Nageoires dorsale et anale plutôt arrondies

Espèce rare

Taille max.	91 cm	TL
Taille obs.	8-33 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



©IRD




©FishBase

## Orphie plate ▶ Flat needlefish ▶ Agujón sable

*Ablennes hians*

Mâchoires supérieures et inférieures très allongées  
et parsemées de petites dents pointues

Tâches noires au milieu du corps



Nageoires pectorales falciformes

Corps fortement comprimé latéralement

Espèce commune

Taille max.	140 cm	TL
Taille obs.	32-116 cm	TL


présente dans

Atlantique

Indien



## Aiguille crocodile ► Hound needlefish ► Marao lisero


*Tylosurus crocodilus*

Nageoire caudale profondément fourchue, lobe inférieur beaucoup plus long que le lobe supérieur


Espèce commune		
Taille max.	150 cm	TL
Taille obs.	80-120 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Escolier serpent ▶ Snake mackerel ▶ Escolar de canal

*Gempylus serpens*

Espèce assez rare		
Taille max.	195 cm	FL
Taille obs.	66-105 cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Lancier longnez ▶ Long snouted lancetfish ▶ Lanzón picudo

*Alepisaurus ferox*

Espèce assez rare		
Taille max.	195 cm	FL
Taille obs.	NA-NA cm	FL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Poisson lune ▶ Ocean sunfish ▶ Pez luna

*Mola mola*

Nageoires pectorales petites et arrondies, dirigées vers le haut

Le corps sans écailles est recouvert d'une peau épaisse



Très petites dents fusionnées formant un bec de perroquet


Espèce assez rare		
Taille max.	333 cm	TL
Taille obs.	52-185 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Poisson-lune à bosse ▶ Bumphead sunfish ▶ [NA]


*Mola alexandrini*

NB: En l'absence de code FAO dédié pour *M. alexandrini* on utilisera MOP qui correspond aux *Mola spp* en précisant à chaque fois l'espèce dans les notes



Espèce assez rare		
Taille max.	300 cm	TL
Taille obs.	65-207 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



Poisson lune lancéolé ▶ Sharptail mola ▶ *Mola coliaiguda**Masturus lanceolatus*


Corps ovale, la hauteur du corps est égale à  $\frac{1}{2}$  de la longueur du corps

Espèce assez rare

Taille max.	337 cm	TL
Taille obs.	48-161 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Ranzania ► Slender sunfish ► Bot allargat

*Ranzania laevis*

Nageoires dorsale et anale de forme similaire positionnées en arrière sur le corps

Espèce assez rare

Taille max.	100 cm	TL
Taille obs.	45-62 cm	TL


présente dans

Atlantique

Indien



# Rémora commun ▶ Live sharksucker ▶ Pegatimón

*Echeneis naucrates*

Espèce commune		
Taille max.	110 cm	TL
Taille obs.	9-81 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




# Rémora des requins ▶ Shark sucker ▶ *Rémora tiburonera*

*Remora remora*

Disque céphalique composé de  
15 à 19 lamelles

22 à 26 rayons mous



Couleur du brun clair à brun foncé

22 à 24 rayons mous

Espèce commune

Taille max.	86 cm	TL
-------------	-------	----

Taille obs.	10-78 cm	TL
-------------	----------	----

présente dans


Atlantique

Indien

Hôtes : requins, poissons porte-épée ou cétacés.  
Présent sur au moins 12 espèces de requins




## Rémora des marlins ► Marlin sucker ► Agarrador

*Remora osteochir*


Espèce assez rare		
Taille max.	47 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Rémora des espadons ▶ Spearfish remora ▶ Tardanaves

*Remora brachyptera*

Espèce rare		
Taille max.	50 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Rémora des mantas ▶ White suckerfish ▶ Rémora blanca

*Remora albenscens*

Espèce rare		
Taille max.	34 cm	TL
Taille obs.	12-24 cm	TL
présente dans		
Atlantique		Indien


Hôtes : principalement sur les raies Mobulidae, mais il existe également quelques signalements sur des requins




**Makaire noir, marlin noir ▶ Black marlin ▶ Aguja negra**

*Makaira indica* (ou *Istiompax indica*)

Hauteur de la nageoire dorsale (a) = 1/2 ou moins de la hauteur du corps (b)



Seconde dorsale en avant de la seconde nageoire anale



Stries sous la maxillaire (branchiostégiales) relativement longues et écartées par rapport au marlin bleu

Nageoire pectorale rigide en forme de faucille ne pouvant se replier sur le long du corps


Espèce assez rare		
Taille max.	465 cm	LJFL
Taille obs.	154-354 cm	LJFL
présente dans		
<del>Atlantique</del>		Indien




**Makaire bleu, marlin bleu ▶ Blue marlin ▶ Aguja azul**

*Makaira nigricans* (ou *Makaira mazara*)

Hauteur de la nageoire dorsale (a) = 1/2 à 1/3 de la hauteur du corps (b)



Seconde dorsale en arrière de la seconde nageoire anale



Stries sous la maxillaire (branchiostégiales) relativement courtes et serrées en comparaison au marlin noir


Nageoire pectorale mobile de forme droite et allongée pouvant se replier contre le corps (si pas de rigidité cadavérique)

Espèce commune		
Taille max.	459 cm	LJFL
Taille obs.	161-315 cm	LJFL
présente dans		
Atlantique	Indien	



**Marlin rayé ▶ Striped marlin ▶ Marlin rayado**


*Tetrapturus audax* (ou *Kajikia audax*)



Espèce assez rare		
Taille max.	420 cm	LJFL
Taille obs.	112-279 cm	LJFL
présente dans		
<del>Atlantique</del>		Indien



## Makaire blanc de l'Atl. ▶ Atlantic white marlin ▶ Aguja blanca del Atl.

*Tetrapturus albidus* (ou *Kajikia albida*)

Première nageoire dorsale plus haute que la majeure partie du reste de la nageoire, membrane couverte de petites taches sombres

©FAO

Extrémité de la première nageoire anale arrondie ou tronquée

Espèce assez rare

Taille max.	300 cm	LJFL
-------------	--------	------

Taille obs.	160-225 cm	LJFL
-------------	------------	------

présente dans

Atlantique

~~Indien~~

©ORTHONGEL



©IRD




©IRD

**Voilier Indo-pacifique ▶ Indo-Pacific sailfish ▶ Pez vela del Indo-Pacífico**

*Istophorus platypterus*

Grande nageoire dorsale  
parsemée de points noirs



©IOTC

Très longues nageoires pelviennes

Corps comprimé latéralement

Espèce commune		
Taille max.	348 cm	LJFL
Taille obs.	111-242 cm	LJFL
présente dans		
<del>Atlantique</del>		Indien



©IRD



©ORTHONGEL




©TAAF

**Voilier de l'Atlantique ▶ Atlantic sailfish ▶ Pez vela del Atlantico**

*Istophorus albicans*

Grande nageoire dorsale parsemée de points noirs




Très longues nageoires pelviennes

Corps comprimé latéralement


Espèce commune		
Taille max.	315 cm	LJFL
Taille obs.	130-212 cm	LJFL
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	



## Makaire bécune ▶ Longbill spearfish ▶ Aguja picuda

*Tetrapturus pfluegeri*

Absence de marques verticales et de tâches sur la nageoire dorsale ou le corps




Extrémités pointues de la première dorsale et de la première nageoire anale

Espèce rare		
Taille max.	254 cm	LJFL
Taille obs.	100-220 cm	LJFL
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	



**Makaire à rostre court ▶ Shortbill spearfish ▶ Marlin trompa corta**

*Tetrapturus angustirostris*




Espèce rare		
Taille max.	230 cm	LJFL
Taille obs.	94-170 cm	LJFL
présente dans		
<del>Atlantique</del>	Indien	



Espadon ▶ Swordfish ▶ Pez espada

*Xiphias gladius*




Espèce commune		
Taille max.	455 cm	LJFL
Taille obs.	77-315 cm	LJFL
présente dans		
Atlantique		Indien



Attention, les juvéniles ont une longue nageoire dorsale



## Requin soyeux ▶ Silky shark ▶ Tiburón jaquetón


*Carcharhinus falciformis*

Espèce commune		
Taille max.	350 cm	TL
Taille obs.	64-210 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



**Requin océanique, longimane ▶ Oceanic whitetip shark ▶ Tiburón oceánico**


*Carcharhinus longimanus*



Première dorsale très large, pointe arrondie tachetée de blanc à l'extrémité

Seconde nageoire dorsale à la pointe arrondie et tachetée de noir

Crête interdorsale



Nageoires pectorales grandes et larges dont les pointes sont arrondies et tachetées de blanc

Grande nageoire caudale pointes tachetées de blanc

Espèce commune		
Taille max.	400 cm	TL
Taille obs.	83-226 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	

La seconde dorsale, les pelviennes et l'anale peuvent être sombres aux extrémités




## Requin peau bleue ▶ Blue shark ▶ Tiburón azul

*Prionace glauca*

Tête allongée et  
museau arrondi

Lobe supérieur de la caudale  
beaucoup plus long que le  
lobe inférieur



Longues pectorales


Espèce assez rare

Taille max.	400 cm	TL
Taille obs.	130-278 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



# Taube bleue ▶ Shortfin mako ▶ Marrajo dientuso

*Isurus oxyrinchus*




©FAO

Museau long et très pointu

Nageoires pectorales plus courtes que la tête

Seconde nageoire dorsale et nageoire anale petites



©IOTC

Lobes supérieur et inférieur de la nageoire caudale de longueur à peu près égale

Espèce assez rare

Taille max.	455 cm	TL
Taille obs.	91-250 cm	TL

présente dans

Atlantique

Indien




©ORTHONGEL




©ORTHONGEL

## Petite taupe ▶ Longfin mako ▶ Marrajo carite

*Isurus paucus*

Tête pointu mais  
mâchoire arrondie




Nageoires pectorales aussi  
longues que la tête

Lobes supérieur et inférieur de la nageoire  
caudale de longueur à peu près égale


Espèce rare		
Taille max.	427 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



## Requin bordé ▶ Blacktip shark ▶ Tiburón macuira

*Carcharhinus limbatus*

Première nageoire dorsale haute et en avant de la base de la nageoire pectorale



Tâches noires sur les pointes des nageoires pectorales, pelviennes, dorsale et caudale qui ont tendance à s'atténuer chez les grands individus

Espèce assez rare

Taille max.	275 cm	TL
Taille obs.	174-238 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




©ORTHONGEL



©ORTHONGEL

## Requin tisserand ▶ Spinner shark ▶ Tiburón aleta negra

*Carcharhinus brevipinna*


Espèce rare		
Taille max.	300 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Extrémités des nageoires dorsale, anale et pectorales et le lobe inférieur de la nageoire caudale généralement noirs ou sombres chez les jeunes individus



Requin babosse ▶ Bignose shark ▶ Tiburón baboso

*Carcharhinus altimus*



Première nageoire dorsale avec un bord antérieur presque droit et un apex étroitement arrondi

Surface dorsale bronze à gris

Crête interdorsale prononcée

©fishIDER


Museau arrondi

Origine de la première nageoire dorsale à l'aplomb de la base de la nageoire pectorale


Surface ventrale presque blanche

Extrémité des nageoires souvent sombre

Espèce rare		
Taille max.	300 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




©fishIDER



©FishBase


## Requin gris à haute dorsale ▶ Sandbar shark ▶ Tiburón trozo

*Carcharhinus plumbeus*

Première nageoire dorsale très grande et semi-courbe

Crête interdorsale étroite

Seconde nageoire dorsale en avant de la nageoire anale




Origine de la première nageoire dorsale à l'aplomb de la base de la nageoire pectorale

## Espèce rare

Taille max.	250 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Requin cuivre ▶ Copper shark ▶ Tiburón cobrizo

*Carcharhinus brachyurus*

Espèce rare		
Taille max.	325 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Requin pointe blanche ▶ Silvertip shark ▶ Tiburón de puntas blancas

*Carcharhinus albimarginatus*

Première nageoire dorsale moyennement grande et semi-courbe

Présence d'une crête interdorsale



Grandes pectorales semi-courbes, aux extrémités pointues ou étroitement arrondies

Pointes et bords postérieurs des nageoires blancs

Espèce rare

Taille max.	300 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL


présente dans

Atlantique

Indien




## Requin bouledogue ▶ Bull shark ▶ Tiburón sarda


*Carcharhinus leucas*

Espèce rare		
Taille max.	360 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Extrémités des nageoires  
sombres surtout chez les jeunes



## Requin balestrine ▶ Pigeeye shark ▶ Tiburón baleta


*Carcharhinus amboinensis*

Espèce rare		
Taille max.	280 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



Requin tigre commun ▶ Tiger shark ▶ *Tintorera tigre**Galeocerdo cuvier*


Museau large, très court et arrondi




Flancs généralement pourvus de rayures verticales sombres qui peuvent s'estomper chez l'adulte

Espèce rare		
Taille max.	750 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



Requin-marteau commun ▶ Smooth hammerhead ▶ *Carnuda cruz**Sphyrna zygaena*

Première nageoire dorsale  
relativement haute et  
semi-courbe



Espèce assez rare

Taille max.	500 cm	TL
Taille obs.	142-265 cm	TL

présente dans


Atlantique

Indien

Profil avant de la tête convexe  
avec indentations latérales et  
sans indentation médiane



## Requin-marteau halicorne ▶ Scalloped hammerhead ▶ Carnuda común

*Sphyrna lewini*

Avant de la tête convexe avec indentations latérales et une indentation médiane marquée

Première nageoire dorsale semi-falciforme modérément haute



Seconde dorsale avec un bord noir

©IOTC


Espèce assez rare

Taille max.	430 cm	TL
Taille obs.	140-276 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




Grand requin-marteau ▶ Great hammerhead ▶ *Carnuda gigante**Sphyrna mokarran*

Espèce rare		
Taille max.	610 cm	TL
Taille obs.	100-276 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Renard à gros yeux ▶ Bigeye thresher ▶ Zorro ojón

*Alopias superciliosus*

Espèce rare		
Taille max.	488 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Renard pélagique ▶ Pelagic thresher ▶ Zorro pelágico

*Alopias pelagicus*

Pas de sillon  
sur la tête

Œil relativement  
gros



Lobe supérieur de la  
caudale très long

Flancs au-dessus des nageoires pectorales et  
pelviennes de couleur foncée uniforme


Nageoires pectorales presque droites et pointues

Espèce rare


Taille max.	428 cm	TL
Taille obs.	179-347 cm	TL
présente dans		
<del>Atlantique</del>		Indien



## Renard ▶ Thresher shark ▶ Zorro

*Alopias vulpinus*


Lobe caudal supérieur presque aussi long que le reste du corps




La couleur ventrale blanche s'étend jusqu'aux flancs au-dessus de la base des nageoires pectorales et pelviennes

Nageoires pectorales courbes et pointues

Espèce rare		
Taille max.	573 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	



## Requin baleine ▶ Whale shark ▶ Tiburón ballena

*Rhincodon typus*

Tête large et plate  
avec une large  
bouche terminale

Tâches claires et rayures verticales sur un fond sombre

Espèce assez rare

Taille max.	1700 cm	TL
Taille obs.	60-1200 cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Raie guitare à nez rond ▶ Bowmouth guitarfish ▶ Tiburón raya

*Rhina ancylostoma*

Crêtes avec des denticules sur le dos, au-dessus des yeux et des spiracles

Origine de la première nageoire dorsale antérieure à celle des nageoires pelviennes



Espèce rare

Taille max.	465 cm	TL
Taille obs.	154-354 cm	TL


présente dans

~~Atlantique~~

Indien




## Diable de mer ▶ Devil fish ▶ Manta mobula

*Mobula mobular*

Espèce commune		
Taille max.	520 cm	DW
Taille obs.	108-301 cm	DW
présente dans		
Atlantique	<del>Indien</del>	




## Mante aiguillat ▶ Spinetail mobula ▶ Manta de aguijón

*Mobula japonica**M. japonica* est en réalité la même espèce que *M. mobular*

Espèce commune		
Taille max.	521 cm	DW
Taille obs.	79-301 cm	DW
présente dans		
Atlantique		Indien



## Mante vampire ▶ Smoothtail mobula ▶ Chupa sangre

*Mobula thurstoni*

## Espèce assez rare

Taille max.	220 cm	DW
Taille obs.	119-217 cm	DW


présente dans

Atlantique

Indien



## Diable de mer chilien ▶ Chilean devil ray ▶ Manta cornuda


*Mobula tarapacana*

Espèce commune		
Taille max.	328 cm	DW
Taille obs.	168-320 cm	DW
présente dans		
Atlantique	Indien	




# Mante géante ▶ Giant manta ▶ Manta gigante

*Mobula birostris* (ou *Manta birostris*)




Espèce commune		
Taille max.	910 cm	DW
Taille obs.	150-525 cm	DW
présente dans		
Atlantique	Indien	



# Pastenague violette ▶ Pelagic stingray ▶ Raya-látigo violeta


*Pteroplatytrygon violacea*



Espèce commune		
Taille max.	96 cm	DW
Taille obs.	26-60 cm	DW
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Tortue olivâtre ▶ Olive ridley turtle ▶ Tortuga golfina

*Lepidochelys olivacea*


Espèce commune		
Taille max.	76 cm	SCL
Taille obs.	39-76 cm	SCL
présente dans		
Atlantique	Indien	




## Tortue caouanne ▶ Loggerhead turtle ▶ Caguama

*Caretta caretta*

Espèce commune		
Taille max.	125 cm	SCL
Taille obs.	39-95 cm	SCL
présente dans		
Atlantique		Indien



## Tortue verte ▶ Green turtle ▶ Tortuga verde

*Chelonia mydas*



## Espèce assez rare


Taille max.	105 cm	SCL
Taille obs.	27-103 cm	SCL

présente dans

Atlantique

Indien



Tortue imbriquée ▶ Hawksbill turtle ▶ *Tortuga carey**Eretmochelys imbricata*

## Espèce assez rare

Taille max.	90 cm	SCL
Taille obs.	21-73 cm	SCL


présente dans

Atlantique

Indien



## Tortue luth ▶ Leatherback turtle ▶ Tortuga laud

*Dermochelys coriacea*

Espèce rare		
Taille max.	257 cm	SCL
Taille obs.	52-167 cm	SCL
présente dans		
Atlantique	Indien	



# Globicéphale tropical ▶ Short-finned pilot whale ▶ Calderón de aletas cortas

*Globicephala macrorhynchus*

Nageoire dorsale large, basse, falciforme, positionnée très en avant sur le dos

Corps robuste, noir, avec une selle grise derrière la nageoire dorsale

Tête globuleuse et sans bec

Nageoires pectorales courtes

©FAO

Espèce rare

Taille max.	610 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL

présente dans

Atlantique

Indien

Bancs généralement composés de 15 à 20 individus, bien que des groupes d'une centaine d'individus ou plus puissent être observés



**Faux-orque ▶ False killer whale ▶ Orca falsa***Pseudorca crassidens*

Tête longue, mince  
et arrondie sans  
bec prononcé

Nageoire dorsale dressée,  
généralement falciforme et  
légèrement arrondie à son  
extrémité

Corps gris foncé/noir avec seulement  
une cape légèrement plus foncée

Nageoire caudale petite par  
rapport à la taille du corps

Tâche grise plus claire sur la  
poitrine entre les deux pectorales

Longues nageoires pectorales fortement coudées avec une  
courbure ou un angle prononcé leur donnant une forme de S

**Espèce rare**


Taille max.	600 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL

présente dans

Atlantique

Indien


## Baleine à bosse ▶ Humpback whale ▶ Rorqual jorobado

*Megaptera noaeangliae*

## Espèce rare

Taille max.	1890 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Habituellement observée en petits groupes ou seule




## Cachalot ▶ Sperm whale ▶ Cachalote

*Physeter macrocephalus*

Event unique situé à l'avant de la tête, légèrement sur la gauche

Nageoire dorsale ne formant qu'une petite bosse

Protubérances charnues entre la nageoire dorsale et la caudale (variable selon les individus)



©IWC

Très grosse tête de forme carrée faisant jusqu'à 1/3 de la longueur totale du corps

Petite nageoire pectorale en forme de spatule

Nageoire caudale triangulaire, lobes pouvant être marqués et déchirés sur les côtés



©IWC

Espèce rare		
Taille max.	2400 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



©WWF



©WWF



©WWF

## Rorqual bleu ▶ Blue Whale ▶ Ballena azul


*Balaenoptera musculus*

Tête uniformément gris/bleu clair, non tachetée à la différence du corps

Bourrelet marqué devant l'évent

Corps gris clair tâché

Petite nageoire dorsale située bien en arrière du corps (peut prendre des formes variables)




©IWC

Espèce rare		
Taille max.	3300 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Nageoires pectorales longues et minces avec des extrémités pointues qui peuvent être plus claires

Pédoncule caudal épais



©IWC



©INPN



©INPN




©IWC



©IWC

## Rorqual commun ▶ Fin whale ▶ Rorcual común


*Balaenoptera physalus*

Espèce rare		
Taille max.	2700 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	



# Dauphin de Risso ▶ Risso's dolphin ▶ Delfín de Risso

*Grampus griseus*



Espèce rare		
Taille max.	380 cm	TL
Taille obs.	NA-NA cm	TL
présente dans		
Atlantique	Indien	

Habituellement en groupes de 10 à 40 individus, mais occasionnellement en groupes plus importants, souvent mélangés avec d'autres odontocètes



Ce guide d'identification des espèces capturées dans les pêcheries tropicales a été élaboré par  
Philippe S. Sabarros ([philippe.sabarros@ird.fr](mailto:philippe.sabarros@ird.fr)), Flore Moussy et Esther Mollier  
sur la base de différents guides produits par

FAO,  
ICCAT,  
IOTC,  
WWF,  
NOAA,  
IWC,  
INPN,  
FishBase.org,  
sealifebase.ca,  
fishIDER, et  
SPC.

